

登革熱(斷骨熱)

台灣主要傳播登革熱的病媒蚊



V.S.

喜好室內	棲息	喜好室外
北迴歸線以南地區	分佈地區	全台1500公尺以下山區及平地
易受驚動而中斷吸血	吸血習性	吸飽血液後才離開

雌性斑蚊朝九晚五
早上9-10點、下午4-5點為吸血高峰期！

典型登革熱症狀

高燒(38°C以上)、倦怠、頭痛、
骨頭痛、後眼窩痛、紅疹。

登革出血熱症狀

皮膚點狀出血、血尿/血便、
嚴重腹痛、躁動、嘔吐、血小板低下

➤ 由於個人感染後表現之症狀有很大的差異，
必須由醫師診斷或實驗室檢，**已懷疑感染時請立即就診。**

- 經由登革病毒感染所造成。

- 主要流行於熱帶、亞熱帶及溫帶地區。

- **症狀** 吸血而傳播，
不會由人直接傳染給人。



登革熱滅子妙招

找出孳生源~



找出孳生源~
任何積水、讓病媒蚊能夠
產卵衍生後代的容器

1 巡

經常巡檢，
避免戶內外積水

2 倒

清除積水，
必要的容器倒置

3 清

容器減量，
清除不要的容器

4 刷

刷洗容器，
避免蟲卵再附著

校園蚊子最愛的地方 你清了嗎？

廁所馬桶



花盆底盤



水溝



洗手台下方



打掃用具



瓶罐空箱



冷卻水塔



塑膠布、帆布



樹洞

