


登革熱 v.s 屈公病 比一比



登革熱

屈公病

比一比

	登革熱	屈公病
傳染途徑	埃及斑蚊、白線斑蚊	
病毒血症期	發病前1天至發病後5天	發病前2天至發病後5天
潛伏期	3至8天（最長可達14天）	2至12天，通常為3至7天
相似症狀	發燒、頭痛、出疹、肌肉痛、關節痛	
嚴重性	少數個案併發登革出血熱	持續或反覆的嚴重關節痛
預防方法	●出國要防蚊，穿著長袖衣褲、使用政府核可防蚊液 ●回國後，有症狀速就醫並告知旅遊史 ●居家環境清除孳生源，落實巡倒清刷 ●住家應裝置紗門、紗窗	

衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

- 由於個人感染後表現症狀有差異，必須由醫師診斷或實驗室檢查，若您或周遭親友**已懷疑感染時請立即就醫!!**
- 已被感染發病5天內，儘量在家休息並適當防護，**避免被蚊子叮咬**，將病毒藉由蚊子傳給家人或周遭友人。



斑蚊卵粒特性:外觀**卵黑色**，可以**耐旱三個月**，再遇水三天內**就會孵化**，且雌斑會把卵產在容器水面邊緣的器壁，所以除了倒掉積水，還要把容器刷洗乾淨，**才能完全清除蚊卵**。



巡



倒



清



刷

別幫蚊子養小孩-滅子4招- **巡、倒、清、刷**